


Vademécum

Animales de producción



California
Fieles a la Vida

ANTIMICROBIANOS



Descensor[®]

Doxiciclina hiclato - Tabletas



Composición

Cada tableta contiene:

Doxiciclina Hiclato	200 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Antibiótico semisintético de amplio espectro indicado para el tratamiento de *Ehrlichiosis* canina, infecciones buco-dentarias y óseas. Otras enfermedades de origen infeccioso causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasmas, *Rickettsias* (*Ehrlichia* sp.) y Espiroquetas.

Dosificación y administración

Vía oral, en perros: 5 - 10 mg/kg, en la práctica, 1 tableta por cada 20-40 kg. En gatos: 5 - 10 mg/kg, en la práctica ½ tableta por cada 10 kg de peso. Administrar cada 12 o 24 horas durante 3 a 5 días en afecciones agudas y subagudas y hasta por 10 días en afecciones crónicas.

En *Ehrlichiosis* los tratamientos van de 21 a 30 días concomitante con corticosteroides y productos para favorecer la maduración plaquetaria.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Precauciones

No usarse en animales en gestación. La coloración de los dientes de los cachorros puede ocurrir, cuando se administran tetraciclinas a la madre durante las últimas 2 a 3 semanas de preñez o a los cachorros durante las primeras semanas de vida. La doxiciclina, por su escasa interacción con el calcio, parece menos propensa a provocar este efecto.

Se ha reportado que la doxiciclina tiene menos efecto sobre la flora intestinal normal y menor toxicidad para gatos que otras tetraciclinas.

Tetraciclina mejorada en absorción, espectro y como antidegradante tisular.



Presentación

Caja x 30 Tabletas

COL REG. ICA 7225 MV
ECU 2CI-15107-AGROCALIDAD
SLV VE2008103819
GTM CO256-07-01-9646
HND PF-4609
NIC 12003
PAN RF-4081-07
DOM 6300
CRI M.A.G. NO. CO71-5-86-4122

Metrodix[®]

Metronidazol – Suspensión oral



Composición

Cada mL de la suspensión contiene:

Metronidazol	80 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias anaerobias como: *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium* sp., *Veillonella* sp., *Clostridioides difficile*, *Clostridium perfringens*, *Eubacterium* sp., *Peptococcus* sp., *Peptostreptococcus* sp., y por Protozoarios especialmente *Giardia intestinalis*, *Trichomonas* sp., y *Entamoeba histolytica*.

Indicado en el tratamiento de infecciones del tracto digestivo (abscesos abdominales, peritonitis, gastritis, duodenitis, en diarreas asociadas a giardias y bacterias anaerobias, absceso amebiano hepático, amebiasis intestinal y hepática). Infecciones de la piel y del tracto genitourinario (uretritis por tricomonas), infecciones osteoarticulares y dentales (osteítis, artritis, periodontitis, gingivitis, otitis media), así como meningitis y en casos de tejidos necróticos.

Dosificación y administración

Vía oral a dosis de 25 mg/kg cada 12 horas o a 50 mg/kg cada 24 horas durante 5 a 10 días o según criterio del Médico Veterinario tratante.

En la práctica, tabla de dosificación:

Peso del animal en kg	Posología de 25 mg/kg de peso vivo. Cada 12 horas	Posología de 50 mg/kg de peso vivo. Cada 24 horas
2	0,6 mL	1,25 mL
4	1,3 mL	2,5 mL
8	2,5 mL	5 mL
12	3,8 mL	7,5 mL
16	5 mL	10 mL
20	6,3 mL	12,5 mL
24	7,5 mL	15 mL
28	9 mL	17,5 mL
32	10 mL	20 mL

Agitar antes de usar. Su administración concomitante con alimentos es bien tolerada.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Ideal contra protozoos y bacterias anaerobias.



Precauciones

Debe utilizarse con precaución y en dosis bajas, en animales con enfermedad hepática o renal.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o derivados 5-Nitroimidazólicos.

No se ha investigado la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y lactancia por lo tanto no administrar durante estos períodos.

Si aparecen signos neurológicos, se debe interrumpir el tratamiento y tratar al paciente sintomáticamente.

Presentación

Frasco x 60 mL

COL REG. ICA 10625 – MV

Quinocalf®

Enrofloxacin - Tabletas



Composición

Cada tableta contiene:

Enrofloxacin	25 y 50 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones del tracto digestivo, genitourinario y respiratorio.

Perros y gatos: *Bordetella bronchiseptica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella* sp., *Salmonella* sp., *Streptococcus* sp., *Actinomyces pyogenes*, *Proteus* sp.

Aves: *Avibacterium paragallinarum*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Escherichia coli*, *Pasteurella* sp., *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.

Dosificación y administración

Perros y gatos: 5 mg/kg. En la práctica, **Quinocalf® 25**: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal, 1 a 2 veces al día, por vía oral, durante 3 – 5 días. **Quinocalf® 50**: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal, 1 a 2 veces al día, por vía oral, durante 3 – 5 días.

Aves: 10 mg/kg. En la práctica, **Quinocalf® 25**: 1 tableta por cada 2½ kg de peso corporal, 1 vez al día, por vía oral, durante 3 – 5. **Quinocalf® 50**: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal, 1 vez al día, por vía oral, durante 3 – 5.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Precauciones

En aves, no utilizarlo una semana antes del sacrificio para consumo humano, ni en aves en producción de huevos. La administración conjunta con antiácidos puede disminuir su absorción. Puede causar retinopatías en gatos dando cuatro veces la dosis recomendada. Los corticoides pueden potencializar la acción de la Enrofloxacin.

Máximo espectro bactericida a la hora de atacar las infecciones.



Presentación

Caja x 50 blíster x 10 Tabletas

Quinocalf® 25

COL REG. ICA 3926 – DB
ECU 2C1-15105-AGROCALIDAD
GTM CO479-07-01-9840
HND PF-3693
NIC 11993
PAN RF-1138-20
DOM 2453
CRI M.A.G. NO. CO71-5-60-1936

Quinocalf® 50

COL REG. ICA 5334 – DB

Quinocalf® 5%

Enrofloxacin – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Enrofloxacin	50 mg
Excipientes, c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas en el tracto digestivo, genitourinario y respiratorio. En el sistema digestivo causadas por *Escherichia coli* (colibacilosis, colidiarrea, colisepticemia, diarrea de los lechones), *Proteus* sp., *Clostridium perfringens* y *Salmonella* sp. (salmonelosis). Aparato respiratorio: *Pasteurella* sp., *Bordetella* sp., *Klebsiella pneumoniae* (neumonía, bronconeumonía, neumonía enzoótica, rinitis atrófica del cerdo), *Mycoplasma* sp. (micoplasmosis, neumonía enzoótica del cerdo), *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp., *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelothrix* sp., *Campylobacter* sp., *Bacillus* sp., y *Clostridium* sp. (infecciones bacterianas solas o asociadas). Infecciones del tracto genitourinario como nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis y vaginitis. En heridas (*Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Streptococcus* sp., y *Staphylococcus aureus*).

Dosificación y administración

Bovinos: 2,5 mg/kg. En la práctica: 5 mL por cada 100 kg de peso, diariamente, durante 3 - 5 días, por vía intramuscular o subcutánea. No aplicar más de 10 mL en el mismo sitio.

Cerdos: 2,5 mg/kg. En la práctica: 0,5-1 mL por cada 10 kg de peso, diariamente, durante 3 - 5 días, por vía intramuscular en la región del cuello. No aplicar más de 2,5 mL en el mismo sitio.

Tiempo de retiro

Carne: 7 días
Leche: 72 horas

Presentaciones

Caja x 3 frascos x 10 mL
Frasco x 50 y 100 mL

Máximo espectro bactericida a la hora de atacar las infecciones.



COL REG. ICA NO. 2949 – DB
ECU 2CI-9437-AGROCALIDAD
SLV VE2014094973
GTM COI92-07-01-9843
NIC 12006
PAN RF-8955-20
DOM 2231
CRI M.A.G.NO.CO22-5-61-1894

Quinocalf® 10%

Enrofloxacin – Solución oral



Composición

Cada mL contiene:

Enrofloxacin	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Aves (pollos de engorde, pollitas y pavos): Para el control y tratamiento de infecciones producidas por *Mycoplasma* sp., *Avibacterium* (*Haemophilus*) *paragallinarum*, *Escherichia coli*, *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus* sp. y *Streptococcus* sp.

Dosificación y administración

Se emplea a la dosis de 10 mg/kg p.v. Vía oral en el agua de bebida durante 3 – 5 días. En la práctica: 1 mL para 2 L de agua, 100 mL para 200 L de agua.

Tiempo de retiro

Las aves tratadas no deben darse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

Presentaciones

Caja x 12 frascos x 10 mL
Frasco x 200 y 1000 mL

**Máximo espectro bactericida a la hora
de atacar las infecciones.**



COL REG. ICA NO. 3251 – DB
ECU 2C1-7548-AGROCALIDAD
SLV VE2006073450GTM
CO256-07-01-9839
NIC 11681
PAN RF-1908-11
DOM 2233
CRI M.A.G. NO. CO64-07-01-1888

Quinocalf® 15% CDK

Enrofloxacin – Solución inyectable

**Fórmula bactericida de dosis única
con rápida y prolongada acción.**



Composición

Cada mL contiene:

Enrofloxacin	150 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Bovinos: Para el control y tratamiento de enfermedad respiratoria causada por *Pasteurella haemolytica* (Mannheimia haemolytica), *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Mycoplasma* sp. En mastitis causadas por *Escherichia coli*.

Porcinos: Para el tratamiento de enfermedad respiratoria causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Dosificación y administración

La dosis básica es de 7,5 mg de enrofloxacin por kg de peso corporal, que equivale a 1 mL por cada 20 kg de peso corporal, en dosis única, de ser necesario repetir a las 72 horas. Para aplicación subcutánea de preferencia o intramuscular.

En mastitis clínica por *E. coli* aplicar 1 mL por cada 30 kg de peso, repetir a las 24 horas, vía intravenosa.

Tiempo de retiro

Carne: 14 días

Leche: 96 horas


Presentaciones

Frasco x 50 y 100 mL



COL REG. ICA NO. 6700 – MV
HND PF-4300
NIC 12008
PAN RF-4082-18
DOM 6301
CRI M.A.G. NO. CO22-5-61-4121

ANTIPARASITARIOS



Avitron®

Fenbendazol - Tabletas



Composición

Cada tableta contiene:

Fenbendazol micronizado	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

En aves de corral, controla parásitos gastrointestinales como: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinae*, *Capillaria* sp., *Raillietina* sp.

Dosis y administración

50 mg de fenbendazol/kg de peso. En la práctica: 1 tableta/2 kg de peso corporal, por vía oral durante 3 días.

Tiempo de retiro

Las aves tratadas no deben ser destinadas para consumo humano hasta después de 3 días de finalizado el tratamiento. No usar en aves en postura.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentaciones

Caja x 50 blíster x 10 Tab

Ovicida, larvicida y adulticida



COL REG. ICA 5342 MV
ECU 3A1-9412-AGROCALIDAD
GTM CO479-42-10-9835
PAN RF-2159-12
DOM 4335

Bovex® 25 Co

Albendazol – Suspensión oral



Composición

Cada 100 mL de suspensión contiene:

Albendazol micronizado	25 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

En bovinos para el tratamiento y control de endoparasitismo producido por: parásitos gastrointestinales – nemátodos (*Ostertagia* sp., *Haemonchus* sp., *Trichostrongylus* sp., *Bunostomum* sp., *Nematodirus* sp., *Cooperia* sp., *Oesophagostomum* sp.). Tenias: *Moniezia* sp. Parásitos pulmonares – nemátodos: *Dictyocaulus* sp. Parásitos hepáticos: *Fasciola hepática*.

Dosis y administración

Por vía oral o intraruminal

Parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 5 mg/kg de peso. En la práctica, 1 mL por cada 50 kg de peso corporal.

Fasciola hepática: 10 mg/kg de peso. En la práctica, 2 mL por cada 50 kg de peso corporal.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Tiempo de retiro

Carne: 15 días
Leche: 72 horas

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C.

Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Control total de los parásitos y la anemia de una vez.



Presentación

Frasco x 120, 250, 500 y 1000 mL
Garrafa x 2000 mL

COL REG. ICA 4918 – DB
ECU 3A1-2-7547-AGROCALIDAD
GTM CO256-42-10-9823
NIC 11571
PAN RF-1364-20
DOM 3783

Coccicalf®

Toltrazuril – Suspensión oral



Composición

Cada mL contiene:

Toltrazuril	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Coccidicida selectivo de dosis única y efecto sistémico, para el tratamiento y control de la coccidiosis en todas las fases de desarrollo parasitario en perros y gatos.

En perros: *Isospora ohioensis*, *Isospora canis*. En gatos: *Isospora felis* e *Isospora rivolta*.

Dosificación y administración

Especie	Dosis	En la práctica	Observaciones
Perro	10–20 mg/kg	1 mL (27 gotas) /5 kg 20 mg/kg dosis única	Cachorros: 15 días de vida Criaderos: repetir a los 14 días
Gatos	10 mg/kg	0,5 mL (14 gotas) /2,5 kg	Durante 2 días

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Presentaciones

Jeringa x 15 mL
Frasco x 120, 500 y 1000 mL
Caja x 12 frascos goteros x 10 mL

**Coccidicida selectivo de dosis
única y efecto sistémico.**



COL REG. ICA 7570-MV
ECU 3A4-18214-AGROCALIDAD
GTM CO256-42-10-9640
NIC 11572
PAN RF-5747-11
DOM 9706
CRI M.A.G. NO. CO64-42-17-5199

Coccicalf®

Toltrazuril 5% - Suspensión oral



Composición

Cada mL contiene:

Toltrazuril	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control efectivo de la coccidiosis en todas las fases de desarrollo intracelular en el huésped de destino.

En pollos de engorde, pollitas y pollonas: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima*, *E. tenella*, *E. mitis* y *E. necatrix*. En pavos: *E. meleagris* y *E. adenoides*. En terneros: *Eimeria bovis*, *E. zuernii* y *E. alabamensis*. En porcinos: *Isospora suis*.

Dosificación y administración

Aves: La dosis recomendada es de 7 mg/kg de peso vivo, vía oral, en el agua de bebida. Esta dosis corresponde a 1 mL por cada 2 L de agua de bebida (a 25 PPM) por 2 días consecutivos.

Terneros: Dosis única preventiva oral de 15 mg/kg de peso vivo. En la práctica, 3 mL/10 kg de peso vivo.

Porcinos: Dosis única preventiva oral de 20 mg/kg de peso vivo. En la práctica, 1 mL/2,5 kg de 3 - 5 días de nacidos.

Ovinos y caprinos: 20 mg/kg, (1 mL/2,5 kg).

Tiempo de retiro

Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta 18 días después de finalizado el tratamiento.

No debe administrarse a ponedoras ni a pollas de levante después de las 16 semanas de vida.

Los bovinos y porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 77 días después de finalizado el tratamiento.

No usar en animales en producción de leche para consumo humano.

Coccidicida selectivo de dosis única y efecto sistémico.



Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentaciones

Jeringa x 15 mL
Frasco x 120, 500, 1000 mL
Caja x 12 frascos goteros x 10 mL

COL REG. ICA 7570 - MV
ECU 3A4-18214-AGROCALIDAD
GTM CO256-42-10-9640
NIC 11572
PAN RF-5747-11
DOM 9706
CRI M.A.G. NO. CO64-42-17-5199

Foxton®

Doramectina 1% – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Doramectina	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control de larga acción de parasitosis internas y externas causadas por:

Bovinos: Nemátodos gastrointestinales: *Ostertagia lirita*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia surnabada*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Mecistocirrus digitatus*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor*, *Trichuris ovis* (adultos); Nematodo o gusano pulmonar (adulto y cuarto estadio de larvas): *Dictyocaulus viviparus* y *Dictyocaulus filaria*; Nematodo o gusano ocular: *Thelazia* spp; Miasis (estados parasitarios): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis*, *Cochliomyia hominivorax*. Ácaros: *Psoroptes bovis* (Var. ovis), *Sarcoptes scabiei*; Garrapatas: Ayuda en el control de *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*; Piojos chupadores: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*; Piojos masticadores: Ayuda en el control de la *Bovicola bovis*; Moscas: Coadyuvante en el control de la mosca de la paleta, *Haematobia irritans*.

Porcinos: Nemátodos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario): *Hyostrongylus rubidus*, *Ascaris summ*, *Strongyloides ransomi* (adulto), *Oesophagostomum dentatum*, *Oesophagostomum quadrispinulatum*, *Trichuris suis*; Nematodo o gusano pulmonar (adulto): *Metastrongylus* spp.; Nematodo o gusano del riñón (adulto): *Stephanurus dentatus*; Piojos chupadores: *Haematopinus suis*; Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei*, Var. *Suis*.

Ovinos: Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum venulosum* y *Trichuris ovis*; Miasis: *Oestrus ovis*, *Cochliomyia hominivorax*.

Dosificación y administración

En bovinos y ovinos por vía intramuscular o subcutánea a dosis de 200 µg por kg de peso corporal (1 mL/50 kg).

En porcinos por vía intramuscular en una dosis de 300 µg por kg de peso corporal (1 mL/33 kg).

Endectocida de liberación lenta y efecto prolongado con más beneficios a mediano plazo



Tiempo de retiro

Bovinos:

Carne: 35 días

Leche: No usar

Porcinos y ovinos:

Carne: 28 días

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C.

Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentación

Frascos x 50 y 500 mL

COL REG. ICA 7274 – MV
PAN RF-4911-09

Foxton® Tre

Doramectina 3,5% – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Doramectina	35 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control de enfermedades parasitarias ocasionadas por nemátodos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia surnabada*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Mecistocirrus digitatus*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor*, *Trichuris ovis* (adultos); Nematodo o gusano pulmonar (adulto y cuarto estadio larvario): *Dictyocaulus viviparus* y *Dictyocaulus filaria*; Nematodo o gusano ocular: *Thelazia* spp.; Miasis (estados parasitarios): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis*, *Cochliomyia hominivorax*; Ácaros: *Psoroptes bovis* (Var. *ovis*), *Sarcoptes scabiei*; Garrapatas de un solo huésped *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*; Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus* y *Haematopinus eurysternus*; Piojos masticadores: Ayuda en el control de la *Damalinia bovis*; Moscas: Coadyuvante en el control de la mosca de los cuernos *Haematobia irritans*.

Acción prolongada

El tratamiento con **Foxton® Tre** en bovinos, controla la reinfestación de los siguientes parásitos:

Parásito	Tiempo de protección
Nematodos intestinales: <i>Haemonchus placei</i> , <i>Cooperia punctata</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i> , <i>Trichostrongylus axei</i>	49 días
Garrapatas: <i>Rhipicephalus</i> (<i>Boophilus</i>) <i>microplus</i>	70 días
Larvas de moscas: <i>Dermatobia hominis</i> (nuche)	+100 días

Dosificación y administración

En bovinos administrar por vía intramuscular o subcutánea a dosis de 700 µg de doramectina por kg de peso corporal (1 mL/50 kg).

Menos resistencia parasitaria,
menos tiempo de retiro, más kilos.



Tiempo de retiro

Carne: 70 días
Leche: No usar

Precauciones

No utilizar en hembras en gestación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentación

Frasco x 50, 250 y 500 mL

COL REG. ICA 10693-MV

Galgocal®

Albendazol · Praziquantel, Tabletas



Composición

Cada tableta contiene:

	Galgocal® 200	Galgocal® 600
Albendazol micronizado	200 mg	600 mg
Praziquantel	30 mg	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta	1 tableta

Indicaciones

Tratamiento y control del parasitismo producido por nematodos, cestodos, tenias y giardias.

Dosificación y administración

Por vía oral, en una sola dosis.

Dosis básica:

Albendazol, 30 mg/kg de peso. Praziquantel, 5 mg/kg de peso.

En la práctica:

Galgocal® 200: 1 Tableta por cada 6 kg de peso.

Galgocal® 600: 1 Tableta por cada 20 kg de peso.

En giardiasis a dosis de 25 mg/kg de albendazol, vía oral cada 12 horas durante 2 días consecutivos en perros y durante 5 días en gatos.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Presentación

Galgocal® 200 y **Galgocal® 600:** Caja x 30 sobres x 2 Tabletas

Protección antiparasitaria integral de la mascota y la familia.



Galgocal® 200

COL REG. ICA 4854-DB
ECU 3A2-6748-AGROCALIDAD
SLV VE2013014629
GTM CO517-42-10-1297
HND PF-6483
NIC 12003
PAN RF-8954-20
CRI M.A.G. NO. CO71-42-10-2387

Galgocal® 600

COL REG. ICA 4853-DB
ECU 3A1-2-6747-AGROCALIDAD
SLV VE2013014630
GTM CO517-42-10-12978
HND PF-6482
NIC 11996
PAN RF-1137-19
CRI M.A.G. NO. CO71-42-10-2388

Galgocal® Pool

Fenbendazol · Praziquantel · Toltrazuril – Suspensión oral

Protección antiparasitaria integral de la mascota y la familia.



Composición

Cada mL de la suspensión contiene:

Fenbendazol	100 mg
Praziquantel	10 mg
Toltrazuril	20 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Tratamiento y control del parasitismo gastrointestinal ocasionado por nematodos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Capillaria aerophila*. Cestodos o tenias: *Cysticercus pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Joyeuxiella pasqualei* y *Mesocestoides* sp. Útil en el tratamiento y prevención de la coccidiosis por *Cystoisospora canis*, *Cystoisospora felis*. Es efectivo contra infecciones por *Lambli*a *intestinalis* quísticas y activas.

Dosificación y administración

Administrar vía oral a una dosis de 50 mg/kg de Fenbendazol, 5 mg/kg de Praziquantel, 10-20 mg/kg de Toltrazuril.

En la práctica, para tratamiento de nematodosis intestinal y coccidiosis: administrar vía oral 1 mL de la jeringa por cada 2 kg de peso, en perros y gatos, única dosis.

Para el tratamiento de giardiosis: administrar vía oral 1 mL de la jeringa por cada 2 kg de peso, cada 24 horas, durante 3 - 5 días consecutivos en perros y gatos.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Precauciones

No administrar durante los dos primeros tercios de la gestación.

No usar en cachorros de 4 semanas, ni en gatitos de menos de 6 semanas de vida.



Presentación

Caja con jeringa x 5 mL

COL REG. ICA 10625 – MV

Bañol® EC

Amitraz 12,5% – Solución emulsificable

Garrapaticida y acaricida selectivo para perros.



Composición

Cada 100 mL de solución contiene:

Amitraz12,5 g

Excipientes c.s.p.100 mL

Indicaciones

Para el control y tratamiento de la sarna demodéica (*Demodex canis*), sarcóptica (*Sarcoptes scabiei var canis*) y para el control de la garrapata del perro (*Rhipicephalus sanguineus*).

Dosificación y administración

Indicación	Dosis	Frecuencia
Garrapatas	2 mL en 1 L de agua (250 ppm)	Cada 20 días, fumigar instalaciones y cama con el sobrante.
Sarna	3 mL en 1 L de agua (375 ppm)	3 – 4 tratamientos cada 10 – 14 días

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Clasificación toxicológica III: Medianamente tóxico.

Presentaciones

Caja x 12 frascos x 33 mL



COL REG. ICA 3313-DB
ECU 3BI-7549-AGROCALIDAD
SLV VE2006073446
GTM CO416-43-02-9825
HND IP-409
NIC 11684
PAN RF- 46-20
DOM 2297
CRI M.A.G. NO. CO21-43-06-1898

Ivermax® Titanio

Ivermectina 3,15% – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Ivermectina	31,5 mg
Excipientes, c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (formas adultas y cuarto estado larvario): *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*; Parásito pulmonar (forma adulta y en el cuarto estado larvario): *Dictyocaulus viviparus*; Parásitos externos: Nucho (tórso o tupe): *Dermatobia hominis* (fases parasitarias); Piojos: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus* y ayuda en el control de *Damalinia bovis*; Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis var. bovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis* (ayuda a su control); Miasis: *Cochliomyia hominivorax*; Garrapatas: Ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Acción prolongada

Para el control de la reinfestación por los siguientes parásitos internos y externos:

Parásito	Tiempo de protección (días)
<i>Haemonchus placei</i> , <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Cooperia punctata</i> , <i>Cooperia oncophora</i>	42
<i>Ostertagia ostertagi</i> y <i>Oesophagostomum radiatum</i>	49
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	63
<i>Psoroptes communis var. bovis</i>	56
<i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i>	75
<i>Dermatobia hominis</i>	140

Dosificación y administración

630 µg/kg de peso. En la práctica, 1 mL/50 kg de peso, por vía subcutánea únicamente.

Tiempo de retiro

Carne: 122 días · Leche: No usar

No administrar dentro de los 122 días antes del parto.

Endectocida de liberación programada con más y mayores beneficios a corto y largo plazo.



Precauciones

No administrar a animales menores de 4 meses. Solamente para uso por vía subcutánea en bovinos. Entierre o incinere los envases desocupados.

Presentación

Frasco x 50, 250 y 500 mL

COL REG. ICA 6246-MV
ECU 3A1-BI-2-9433-AGROCALIDAD
SLV VE2014094972
HND PF-3776
PAN RF-2780-14
DOM 5212

Pegasus® Titanio

Ivermectina 1% · Praziquantel 12,5% – Pasta oral



Composición

Cada 100 g contiene

Ivermectina	1 g
Praziquantel	12,5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Indicaciones

En equinos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales. Nematodos: *Strongylus vulgaris* (formas adultas y estados larvarios localizados en arterias). Formas adultas y larvarias de *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus* sp., *Cyathostomum* sp., *Cylicocyclus* sp., *Cylicodontophorus* sp., *Cylicostephanus* sp., *Gyalocephalus* sp., formas adultas y larvarias de *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, formas adultas de *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Habronema muscae* y *Draschia megastoma*, formas gástricas y orales de *Gasterophilus* sp. Tenias: *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*, *Paranoplocephala* sp.

Parásitos cutáneos: Formas larvarias de *Habronema* y *Draschia* sp. y *Microfilarias de onchocerca* sp.

Parásitos pulmonares: Formas adultas y larvarias de *Dictyocaulus arnfieldi*.

Dosificación y administración

Dosis básica: 200 mcg de ivermectina y 2,5 mg de praziquantel por kg de peso vivo.

En la práctica: 1 g/50 kg de peso vía oral. El émbolo de la jeringa debe desplazarse hasta la cantidad seleccionada según el peso del animal. Cada marca numerada de la jeringa aporta 1 g.

Tiempo de retiro

Carne: 30 días

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

**Agradable sabor de larga acción
antiparasitaria**



Presentación
Jeringa con 12 g

COL REG. ICA NO. 7481-MV
PAN RF-6490-13

Bañogan®

Fipronil 1% – Solución tópica lista para usar pour-on



Composición

Cada 100 mL contiene:

Fipronil	1 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

En bovinos, para el control de garrapatas (*Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* y *Amblyomma cajennense*), piojos (*Damalinia* sp, *Haematopinus* sp) y moscas: *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca* sp. Tratamiento y control de miasis o gusaneras por larvas de *Cochliomyia hominivorax* y *Dermatobia hominis* (nuches o tórsalos).

Dosis y administración

Para uso externo únicamente. Aplicar 10 mL/10 kg de peso vivo sobre el dorso del animal.

Tiempo de retiro

Carne 100 días
Leche: no usar

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C.

Presentación

Frasco dosificador x 500 y 1000 mL

Mayor control de plagas por más tiempo.



COL REG. ICA NO. 8667 – MV
GTM CO416-43-02-9688
NIC 11685
PAN RF-8722-20
CRI M.A.G. NO. CO21-43-10-6273

Bañol® EC

Amitraz 12.5% – Solución emulsificable



Composición

Cada 100 mL contiene:

Amitraz	12,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

Para el control de las garrapatas *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* y *Amblyomma cajennense*.

Dosis y administración

Dilución 1:600, 1 mL de **Bañol®** / 600 mL de agua (33 mL/20 L de agua) para baño por aspersión.

Bañar cada 21 días para *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* y cada 7 días para *Amblyomma cajennense*.

Tiempo de retiro

Carne: 14 días

Leche: 24 horas

Precauciones

No utilizar en equinos, ni en baños de inmersión.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C.

Presentaciones

Caja x 12 frascos x 33 mL

**Acaba con seguridad las garrapatas,
las tumba y las mata.**



COL REG. ICA NO. 3313-DB
ECU 3B1-7549-AGROCALIDAD
SLV VE2006073446
GTM CO416-43-02-9825
HND IP-409
NIC 11684
PAN RF- 46-20
DOM 2297
CRI M.A.G. NO. CO21-43-06-1898

Moskofin® CIK

Cipermetrina 5% - Polvo listo para uso

Uso en **Instalaciones pecuarias**

Composición

Cada 100 g contiene:

Cipermetrina más Ftalato	5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Indicaciones

Insecticida de uso en instalaciones pecuarias, criaderos, perreras, hogares, plazas de mercado.

Modo de uso

Aplicación por espolvoreo manual o equipos de dispersión (bombas insufladoras, pulverizadores o espolvoreadoras) sobre paredes, techos, pisos en instalaciones pecuarias sin animales como galpones, establos, criaderos, apriscos; y/o en instalaciones no pecuarias (hogares, plazas, etc.), utilizando 5 g por m² de superficie. Aplicar luego de la evacuación de los animales, de la limpieza y desinfección de las instalaciones y al momento del cambio de camas. Ingresar animales a las instalaciones 24 horas después del tratamiento.

Precauciones

Categoría Toxicológica III: medianamente Tóxico. No aplicar directamente sobre animales. Mantenga alejado de productos destinados a la alimentación. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación

Caja x 50 sobres x 15 g



COL REG. ICA 7492-MV
PAN RQ-344-09

Bañol® 20.8

Amitraz 20,8% – Solución emulsificable



Composición

Cada 100 mL contiene:

Amitraz	20,8 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

Para el control de garrapatas del ganado bovino (*Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* y *Amblyomma cajennense*), contra piojo (*Linognathus vituli* y *Damalinia bovis*).

Dosis y administración

En bovinos, dilución 1:1000, mezclar 1 mL / L de agua (a 208 ppm), bañar los animales usando 1 L de dilución por cada 100 kg de peso animal, por aspersión con bomba baña ganado o de espalda.

Tiempo de retiro

Carne: 14 días

Leche: 24 horas

Precauciones

No utilizar en equinos, ni en baños de inmersión. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentaciones

Caja x 12 frascos x 20 mL

Frascos x 120, 500 y 1000 mL

**Acaba con seguridad las garrapatas,
las tumba y las mata.**



COL REG. ICA NO. 7840 – MV
ECU RIP-FAR-178
GTM CO416-43-02-9687
HND IP-695
NIC 11794
PAN RF-8714-20
DOM 11291

Moskofin® EC

Cipermetrina 15% – Solución emulsificable



Composición

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina	15 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

En bovinos para el control de las moscas hematófagas *Stomoxys calcitrans* (mosca de los establos) y *Haematobia (Lyperosia) irritans* (mosca de los cuernos). Para el control de garrapatas sensibles a la cipermetrina como *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense*.

Dosis y administración

En dilución para baños de animales, 1:1000, 1 mL por cada 1000 mL de agua, 20 mL x 20 L de agua.

Frecuencia de los baños para el control rutinario de las garrapatas, moscas y piojos se recomienda cada 21 días. Para control y erradicación de *boophilus* cada 14 días. *Amblyomma*, *Rhipicephalus*, *ixodes*, cada 7 días.

Tiempo de retiro

Carne: 48 horas
Leche: 24 horas

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en su empaque, en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30°C.

Presentación

Caja x 12 frascos x 20 mL
Frascos x 120, 500 y 1000 mL

**Mosquicida y garrapaticida
piretroide en bovinos**



COL REG. ICA NO. 2742-DB
ECU 3BI-2-9417-AGROCALIDAD
SLV VE2006073454
GTM CO416-43-02-9961
HND IP-411
NIC I1793
PAN RF- 53-20
CIR M.A.G. NO. CO21-43-06-1927

Moskofin® CIK

Cipermetrina 5% – Polvo listo para usar

Uso en **instalaciones pecuarias**

Composición

Cada 100 g contiene:

Cipermetrina	5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Indicaciones

Insecticida de uso en instalaciones pecuarias, criaderos, perreras, hogares, plazas de mercado.

Modo de uso

Aplicación por espolvoreo manual o equipos de dispersión (bombas insufladoras, pulverizadores o espolvoreadoras) sobre paredes, techos, pisos en instalaciones pecuarias sin animales como galpones, establos, criaderos, apriscos; y/o en instalaciones no pecuarias (hogares, plazas, etc.), utilizando 5 g por metro cuadrado de superficie. Aplicar luego de la evacuación de los animales, de la limpieza y desinfección de las instalaciones y al momento del cambio de camas. Ingresar animales a las instalaciones 24 horas después del tratamiento.

Precauciones

Categoría toxicológica III: medianamente tóxico. No aplicar directamente sobre animales. Mantenga alejado de productos destinados a la alimentación. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación

Caja x 50 sobres x 15 g

**Insecticida, aracnicida y formicida
para instalaciones pecuarias**



COL REG. ICA NO. 7492-MV
PAN RQ-344-09



ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICOS

ANTIALÉRGICOS

Aler-caf®

Cetirizina diclorhidrato - Tabletas

*Coadyuvante en el tratamiento de las alergias,
prurito y atopía de piel.*



Composición

Cada tableta contiene:

Cetirizina diclorhidrato	10,00 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Antihistamínico antagonista de los receptores H1. Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades alérgicas de la piel. En tratamiento complementario para la picazón asociada con las alergias y la dermatitis atópica canina.

Dosificación y administración

Administración oral, a dosis de 0,5-1,0 mg/kg de peso, cada 12-24 horas. En la práctica, 1 Tableta por cada 10-20 kg de peso.

Comenzar la terapia con dosis bajas y aumentar gradualmente la dosis, cada 7 a 14 días, hasta que se controle el prurito o se observen efectos adversos objetables. La dosificación, frecuencia de administración y duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de los síntomas o a criterio del Médico Veterinario.

Presentación

Caja x 10 Tabletas



COL REG. ICA 10428 MV

Aler-caf®

Cetirizina diclorhidrato – Tabletas

*Coadyuvante en el tratamiento de las alergias,
prurito y atopía de piel.*



Composición

Cada tableta contiene:

Cetirizina diclorhidrato	10,00 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Antihistamínico antagonista de los receptores H1. Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades alérgicas de la piel. En tratamiento complementario para la picazón asociada con las alergias y la dermatitis atópica canina.

Dosificación y administración

Administración oral, a dosis de 0,5-1,0 mg/kg de peso, cada 12-24 horas. En la práctica, 1 Tableta por cada 10-20 kg de peso.

Comenzar la terapia con dosis bajas y aumentar gradualmente la dosis, cada 7 a 14 días, hasta que se controle el prurito o se observen efectos adversos objetables. La dosificación, frecuencia de administración y duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de los síntomas o a criterio del Médico Veterinario.

Presentación

Caja x 10 Tabletas



COL REG. ICA 10428 MV

Aquan®-Vet

Triclorometiazida · Betametasona

Solución inyectable



Composición

Cada mL de solución contiene:

Triclorometiazida	15 mg
Betametasona Sodio Fosfato	0,98 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y control del edema de la glándula mamaria y estructuras anexas durante el posparto. En afecciones edematosas de múltiples de causas no infecciosas.

Dosificación y administración

Bovinos: Aplicar 15 mL, intramuscular, durante 3 días máximo o a criterio del médico veterinario.

Equinos: 1 mL/135 kg de peso, intramuscular, durante 3 días máximo o a criterio del médico veterinario. En la mayoría de los casos se aprecia mejoría de los síntomas en las primeras 12 horas.

Tiempo de retiro

Carne 21 días

Leche 72 horas

Presentación

Frascos x 15 y 30 mL

Tratamiento y prevención del edema de la ubre y de la vaca caída.




COL REG. ICA NO. 4168 – DB
ECU 9A5-12A-5135-AGROCALIDAD
SLV VE2006073447
GTM CO547-56-08-9830
HND PF-3689
NIC 11686
PAN RF-1906-11
DOM 2692
CRI M.A.G. NO. CO17-56-1-1565

GASTROINTESTINAL



DERMATOLÓGICOS



Aler-caf®

Cetirizina diclorhidrato - Tabletas

*Coadyuvante en el tratamiento de las alergias,
prurito y atopía de piel.*



Composición

Cada tableta contiene:

Cetirizina diclorhidrato	10,00 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Antihistamínico antagonista de los receptores H1. Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades alérgicas de la piel. En tratamiento complementario para la picazón asociada con las alergias y la dermatitis atópica canina.

Dosificación y administración

Administración oral, a dosis de 0,5-1,0 mg/kg de peso, cada 12-24 horas. En la práctica, 1 Tableta por cada 10-20 kg de peso.

Comenzar la terapia con dosis bajas y aumentar gradualmente la dosis, cada 7 a 14 días, hasta que se controle el prurito o se observen efectos adversos objetables. La dosificación, frecuencia de administración y duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de los síntomas o a criterio del Médico Veterinario.

Presentación

Caja x 10 Tabletas



COL REG. ICA 10428 MV

Saniderm® Sanivet® Plus*

**Producto de uso exclusivo para Costa Rica*

Gentamicina · Clotrimazol · Betametasona · Óxido de zinc
Crema tópica



Composición

Cada 100 g contiene:

Clotrimazol	1 g
Gentamicina	0,10 g
Betametasona	0,05 g
Óxido de Zinc	5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Indicaciones

Antimicótico, antibacteriano, antiinflamatorio, antialérgico y cicatrizante de uso externo.

Para el tratamiento tópico de enfermedades de la piel ocasionadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Proteus* sp., *Pseudomona aeruginosa*, *Shigella* sp., *Streptococcus* sp. y *Staphylococcus* sp.

Dosificación y administración

Aplicar sobre la región afectada de la piel cantidad suficiente, distribuyéndola uniformemente, 2 veces al día hasta obtener mejoría.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del médico veterinario.

Presentación

Tubo x 40 g
Tarro x 200 g

*Protege integralmente la primera
barrera de defensa: la piel.*



COL REG. ICA NO. 4321 – DB
ECU 2CI-12A-191-5964-AGROCALIDAD
SLV VE2006083483
GTM CO256-15-07-9836
HND PF-3778
NIC I1995
PAN RF-55-20
DOM 2778
Sanivet Plus – CIR M.A.G. NO. CO64-17-10-1568

Mikomax®

Ketoconazol - Tabletas



Composición

Cada tableta contiene:

Ketoconazol	200 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

Indicaciones

Para el tratamiento de micosis (hongos) sistémicas y locales. En dermatitis y otitis causadas por *Malassezia pachydermatis*, en esporotricosis (*Sporothrix schenckii*) y en dermatofitosis causadas por *Microsporum canis*, *Trichophyton mentagrophytes* y *Microsporum gypseum*.

Dosificación y administración

Dermatomycosis (hongos superficiales), se administra vía oral.

Perros: 5 - 10 mg/kg/día, en la práctica, ½ a 1 tableta/20 kg/día durante 4 a 6 semanas.

Gatos: 5 - 10 mg/kg/día, en la práctica, ¼ tableta/5 kg/día durante 4 a 6 semanas.

Micosis sistémicas (hongos profundos)

Perros: 10 mg/kg 3 veces al día. En la práctica, 1 tableta/20 kg cada 8 horas por 6 semanas.

Gatos: 20 mg/kg 2 veces al día en días alternos o 10 mg/kg/día. En la práctica, ½ tableta/5 kg cada 12 horas día de por medio o ¼ tableta/5 kg/día por 6 semanas.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Interacciones

No administrar simultáneamente con agentes anticolinérgicos. La absorción del ketoconazol es inhibida por la administración concomitante con cimetidina, ranitidina.

Presentación


Caja x 10 tabletas

Tratamiento contra micosis profundas y superficiales.



COL REG. ICA 6736-MV
ECU 2C4-15086-AGROCALIDAD
SLV VE2014094975
GTM CO256-17-10-9638
HND PF-6484
NIC 12001
PAN RF-4953-19
DOM 6395
CRI M.A.G. CO71-17-3-5059

HEMOSTÁTICOS



Quercetol® Vet

Etamsilato – Solución inyectable

**Hemostático madurador de plaquetas,
antioxidante, antiinflamatorio y angioprotector.**



Composición

Cada mL contiene:

Etamsilato	125 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Como coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas.

Dosificación y administración

6,25–12,5 mg/kg de peso. En la práctica, aplicar 1 mL/10–20 kg de peso por vía intravenosa o intramuscular, cada 6–8 horas, hasta la resolución de los síntomas. Para el control de hemorragias durante procedimientos quirúrgicos, aplicar 15–30 minutos antes.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Presentación

Caja x 3 y 5 frascos x 10 mL



COL REG. ICA 7013-MV
SLV VE2008103820
HND PF-6469
NIC 11795
PAN RF-4147-18
DOM 6336
CRI M.A.G. NO. CO17-23-01-4118

Quercetol® Vet

Etamsilato – Solución inyectable

**Hemostático madurador de plaquetas,
antioxidante, antiinflamatorio y angioprotector.**



Composición

Cada mL contiene:

Etamsilato	125 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Como coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas.

Dosificación y administración

En bovinos y equinos: 5 – 7,5 mg/kg.
En la práctica, 1 mL/15 – 25 kg de peso.

En porcinos: 6,25 – 12,5 mg/kg de peso.
En la práctica 1 mL/10 – 20 kg de peso.

Se aplica por vía intravenosa o intramuscular.

Para el control de hemorragias durante procedimientos quirúrgicos, aplicar 15 – 30 minutos antes. Como tratamiento, administrar la dosis inicial y repetir cada 6 horas a mitad de dosis, hasta que el efecto deseado sea alcanzado.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del médico veterinario.

Tiempo de retiro

No tiene.

Presentación

Caja x 3 y 5 frascos x 10 mL
Frasco x 50 mL



COL REG. ICA NO. 7013-MV
ECU 10AI-15106-AGROCALIDAD
SLV VE2008103820
HND PF-6469
NIC 11795
PAN RF-4147-18
DOM 6336
CRI M.A.G. NO. CO17-23-01-4118

Quercetol® Vet

Etamsilato – Tabletas



Composición

Cada tableta recubierta contiene:

Etamsilato70 mg y 100 mg

Excipientes c.s.p.1 tableta

Indicaciones

Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas. Como hemostático sistémico que se utiliza en el contexto pre y posquirúrgico especialmente de urología, cirugía y odontología. Para el control de la hemorragia uterina disfuncional en perras. En traumatología accidental en perros y gatos.

Dosificación y administración

Vía oral a dosis terapéutica de (6,25 – 12,5 mg/kg de peso), cada 6–8 horas, hasta la resolución de los síntomas o 15–30 minutos antes del procedimiento quirúrgico a realizar. En la práctica,

Presentación	Dosis (perro y gato)	Frecuencia	Vía
Quercetol® - Vet 70 mg	1 tab / 3 a 5,5 kg	Cada 6 a 8 horas*	Oral
Quercetol® - Vet 100 mg	1 tab / 11 a 16 kg	Cada 6 a 8 horas*	Oral

Quercetol® Vet 70 mg:

Peso del perro (kg)	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura
5	½ tableta	1 tableta
10	1 tableta	2 tableta

Quercetol® Vet 100 mg:

Peso del perro (kg)	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura
10	½ tableta	1 tableta
15	1 tableta	2 tableta
20	1 tableta	2 y ½ tabletas
25	1 y ½ tabletas	3 tabletas
30	2 tabletas	3 y ½ tabletas
40	2 y ½ tabletas	5 tabletas

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del Médico Veterinario.

Hemostático madurador de plaquetas,
antioxidante, antiinflamatorio y angioprotector.




Presentación

Blíster x 10 Tabletas

Quercetol® Vet 70 mg:
COL REG. ICA 9849-MV
ECU RIP-FAR-169
GTM CO256-23-05-9643
NIC 12002
PAN RF-8713-20
CRI M.A.G. NO. CO64-23-5-6495

Quercetol® Vet 100 mg:
COL REG. ICA 9848-MV
ECU RIP-FAR-160
GTM CO256-23-05-9645
NIC 12000
PAN RF-8718-20

VITAMINAS Y MINERALES



Bonavit®

Vitaminas B1, B2, B6, B12 · Niacinamida · Pantotenato de calcio
Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Vitamina B1	10 mg
Vitamina B2	3 mg
Vitamina B6	5 mg
Vitamina B12	100 µg
Niacinamida	100 mg
Pantotenato de Calcio	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Antianémico y vigorizante. Terapia balanceada, reconstituyente en deficiencias y estados carenciales de cualquiera de las vitaminas del Complejo B. Eficaz en animales antianémicos y convalecientes.

Dosis y administración

Bovinos y equinos: 2 mL/50 kg.

En ovinos, caprinos y porcinos: 1 mL/25 kg, vía intramuscular por 3 – 5 días.

Tiempo de retiro

No tiene.

Presentación

Caja x 12 frascos x 10 mL
Frasco x 30, 100, 250 y 500 mL

**Completo Complejo B, antianémico
y vigorizante.**



COL REG. ICA NO. 2086-DB
ECU 1A-13801-AGROCALIDAD
SLV VE2006073449
GTM CO534-07-07-9821
HND PF-4299
PAN RF-8956-20
DOM 2257

Bonavit® Suspensión

Calcio · Fósforo · Vitamina D3, A · Complejo B
Suspensión oral



Composición

Cada 100 mL de suspensión contiene:

Calcio (mínimo) asimilable	10,41%
Fósforo (mínimo) asimilable	5,9%
Vitamina D3	5000 UI
Vitamina A	50000 UI
Vitamina B1	600 µg
Vitamina B2	2,5 mg
Vitamina B6	4 mg
Vitamina B12	30 µg
Niacinamida	10 mg
Flúor (máximo)	0,05%
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones

Fuente altamente concentrada de calcio y fósforo con vitaminas A, D3 y vitaminas del Complejo B. Especial para usar en animales en crecimiento (terneros y lechones). También para hembras lactantes.

Dosificación y administración

Diariamente, por vía oral, en las siguientes cantidades:

Terneros: 25 mL/50 kg de peso por día (2½ cucharadas soperas).
Se puede mezclar con lactoreemplazadores.

Lechones: 10 mL/5 kg de peso por día (1 cucharada sopera).

Tiempo de retiro

No tiene.

Presentación

Frasco x 120, 250 y 500 mL

**Balance de nutrientes para crecer con
huesos fuertes y sanos.**



COL REG. ICA NO. 6374 SL
ECU 10AB-6806-AGROCALIDAD
SLV VET2006073463
GTM CO256-07-07-9829
HND PF-4058
NIC 12005
PAN RF-8880-20
DOM 3521
CRI M.A.G. NO. CO64-67-04-1929

Calfosvit® Se

Fósforo · Yodo · Zinc · Selenio – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Fosforilcolamina	100 mg
Sulfato de Zinc	8,2 mg
Yoduro de Potasio	20 mg
Selenito de Sodio	0,34 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

En bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos y caninos, como coadyuvante en el tratamiento de trastornos reproductivos relacionados con deficiencias de fósforo, yodo, zinc y selenio. Estimula y favorece la aparición de los celos. Estimula la función reproductiva y la maduración folicular, mejorando la tasa de concepción. En los machos ayuda a prevenir el descenso de la libido, la baja calidad del semen y los trastornos de la espermatogénesis.

Dosificación y administración

Aplicar 1 mL por cada 20 kg de peso por vía intravenosa o intramuscular diariamente durante 3 a 5 días o más si es necesario. Las dosis y frecuencia podrán ser ajustadas a criterio del médico veterinario.

Tiempo de retiro

No tiene.

Presentación

Frasco x 50, 250 y 500 mL

Fortaleza Re-Productiva



COL REG. ICA NO. 5117 – DB
ECU 10B-11181- AGROCALIDAD
SLV VE2006073451
GTM CO192-07-05-9842
HND PF-3690
NIC 11569
PAN RF-2498-13
DOM 4886

Calfosvit® ATP

Fósforo · Yodo · Zinc · Selenio · Cobre · Lisina · ATP
Solución inyectable



Composición

Cada mL de solución inyectable contiene:

Adenosín trifosfato disódico (ATP)	6,0 mg
Fosforilcolamina	100 mg
Yoduro de potasio	20 mg
Sulfato de cobre pentahidratado	11,8 mg
Sulfato de zinc monohidratado	7,34 mg
Selenito de sodio pentahidratado	0,34 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

En bovinos, caprinos y porcinos, mejora el desarrollo y crecimiento de los animales, desarrollo de órganos sexuales, glándula mamaria y crecimiento testicular. Mejora el desarrollo de terneras de reemplazo, reduce el tiempo a la pubertad y aumenta la longevidad reproductiva.

Dosificación y administración

Aplicar 1 mL por cada 20 kg de peso por vía intramuscular a dosis única, repetir 2 a 3 meses o a criterio del médico veterinario.

Tiempo de retiro

No tiene.

Precauciones

No exceder un volumen de 15 mL por sitio de aplicación intramuscular en bovinos y de 5 mL de aplicación intramuscular en porcinos y caprinos.

Presentación

Frasco x 50, 250 y 500 mL

Calfosvit ATP y sus minerales, la combinación que desarrolla reproducción.



COL REG. ICA NO. 10475 - MV

HORMONALES



Mitgan[®] 50

Boldenona undecilinato – Solución inyectable



Composición

Cada mL contiene:

Boldenona Undecilinato	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones

Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades o estados en que se requiera estimular la síntesis proteica como en casos de debilidad, pérdida de peso, estrés, raquitismo, osteomalacia, fracturas, postoperatorios, convalecencias de enfermedades parasitarias e infecciosas, crecimiento eficiente. Es importante en el destete precoz y en debilidad senil. También acelera la formación del callo óseo, lo que es favorable en la consolidación de fracturas.

Dosificación y administración

En bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos: 1 mL por cada 90 kg de peso vivo, por vía intramuscular, se recomienda cada 30 días con un máximo de 3 aplicaciones.

Otras indicaciones, dosis y frecuencias a criterio del médico veterinario.

Tiempo de retiro

Carne 30 días
Leche: No usar

Precauciones

No administrar en hembras gestantes.
No utilizar en casos de tumores malignos como carcinoma de glándula mamaria, próstata y adenoma anal.
Animales jóvenes pueden presentar osificación temprana.

Presentación

Frasco por 10, 50 y 250 mL

Estimula la ganancia de peso diaria.



COL REG. ICA NO. 3769 – DB
ECU 9BI-2-5044-AGROCALIDAD
GTM COI92-26-06-10270
HND PF-3688
NIC I1568
PAN RF- 49-20
DOM 2384

Constantes Fisiológicas

Especie	Frecuencia Respiratoria (resp/min)	Temperatura rectal	Frecuencia Cardíaca (lat/min)	Gestación
	10 - 30 rpm	38 - 39 °C	60 - 80 lpm	276 - 290 Días
	18 - 18 rpm	38,5 - 40 °C	75 - 85 lpm	144 - 152 Días
	10 - 20 rpm	38 - 39 °C	55 - 86 lpm	112 - 116 Días
	10 - 30 rpm	38 - 40 °C	70 - 135 lpm	147 - 155 Días
	10 - 15 rpm	37 - 38 °C	27 - 45 lpm	337 - 344 Días
	10 - 30 rpm	37,5 - 38,5 °C	90 - 110 lpm	60 - 63 Días
	20 - 30 rpm	38 - 39 °C	110 - 140 lpm	60 - 65 Días
	12 - 36 rpm	40 - 42 °C	220 - 300 lpm	21 Días

Nota: las constantes fisiológicas varían según la edad del animal, entre más joven es el animal la mayoría de los parámetros serán más elevados. **Universidad Católica de Cuenca (2019)**

✉ servicioalcliente@alianzacalifornia.com

☎ +57 (1) 744 7878

📷 **Californiafarma**

📍 **Farmacéutica California**

ciacalifornia.com.co