

Virbac



Alizin®

Antiprogestágeno para el control reproductivo de las perras.

Presentación: Frasco 10 ml

Virbac

Alizin® está indicado como tratamiento de las gestaciones no deseadas en perras entre los días 0 a 45 posterior a la monta.

Es un antagonista de la progesterona (anti-progestágeno) llamado Aglepristone, el cual compite por los receptores de la progesterona en el útero, impidiendo la capacidad de mantener la gestación.

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea estricta.

En perras, aplicar 2 inyecciones con intervalo de 24 horas entre una aplicación y otra, a la dosis de 0.34 ml por Kg de peso, es decir, 10 mg/Kg de peso.

Recomendaciones: Aplicar entre las escápulas o en la zona inguinal, después de la aplicación se sugiere dar un masaje ligero en la zona de aplicación. No administrar más de 5 ml en cada punto de inyección.

Advertencias: Puede presentarse dolor en el sitio de aplicación, por inflamación pasajera. En tratamientos tardíos los efectos terapéuticos se pueden acompañar con expulsión de productos orgánicos, ligera anorexia y congestión mamaria. Después del tratamiento el intervalo al próximo estro puede reducirse.

Este producto deberá manipularse con precaución por mujeres embarazadas o personas con susceptibilidad alérgica.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Aglepristone	30 mg
Vehículo c.b.p.	1.0 ml



Allermyl®

Shampoo dermatológico hidratante e hipoalergénico para perros

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

Allermyl® es un shampoo terapéutico, hipoalergénico, cuya formulación favorece el restablecimiento y la hidratación del pelo, restauración de la integridad de la barrera cutánea y el mantenimiento del equilibrio natural de la piel. El ingrediente activo, piroctona olamina, actúa contra hongos y bacterias, controlando la proliferación y reduciendo la carga de alérgenos que representan factores que complican la dermatitis alérgica. Adicionalmente, la presencia de los monosacáridos D-galactosa, L-ramnosa y D-manosa y de los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (ulmaria) y *Peumus boldus* (boldo) actúan en las capas externas e internas de la piel, favoreciendo el equilibrio de sus defensas naturales.

Características y beneficios:

- La piroctona olamina controla la proliferación de hongos y bacterias, reduciendo la carga de alérgenos que complican la condición.
- Ayuda a restaurar la integridad de la barrera cutánea, lo cual es esencial para una piel sana.
- Favorece la hidratación y el buen estado del pelo.
- Los monosacáridos y extractos vegetales actúan en las capas de la piel para promover el equilibrio de sus defensas naturales.
- Formulación suave y especializada para pieles sensibles o con problemas.

Dosis y administración:

Después de mojar el pelo limpio del animal con agua tibia, aplicar el shampoo dermatológico **Allermyl®** esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente el pelaje hasta formar espuma, dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Aplicar una o dos veces por semana, hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Piroctona olamina	500 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

ESPECIES DE DESTINO

Perros



Aquadent FR3SH®

Solución para la higiene oral de perros y gatos

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

Aquadent FR3SH® está indicado para mantener la higiene bucal en perros y gatos, reúne ingredientes naturales importantes para mantener una boca limpia y saludable. Siendo un producto que los animales aceptan fácilmente, **Aquadent FR3SH®** se convierte en una opción palatable y refrescante.

Dosis y administración:

- Agitar antes de usar.
- Diluya 5 ml de **Aquadent FR3SH®** en 500 ml de agua utilizando el vaso dosificador del producto. Después de la dilución, la mezcla debe consumirse dentro de las 24 horas. Preparar nuevas soluciones con **Aquadent FR3SH®** todos los días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Diluido en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS

Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.

Consérvese en un lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar directa.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Eritrol	2%
Inulina	0,5%
Extracto de granada	0,035%
Metabisulfito de sodio	0,0175%
Ácido sórbico	0,05%
Ácido láctico	1%
Aroma de menta	0,2%
Colorante	0,0006%
Vehículo c.b.p.	100%



Citius® 5%

Suspensión antibiótica sin tiempo de retiro en leche

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

En Cerdos:

Citius® 5% Es una suspensión antibiótica a base de Cefalosporina de nueva generación, inyectable de amplio espectro para su uso en porcinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias provocadas por: *Salmonella choleraesuis*, *Actinobacillus spp*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Haemophilus somnus* y auxiliar en el tratamiento de pododermatitis causada por *Fusobacterium necrophorum*.

Recomendado para:

- Cerdos en crecimiento y desarrollo desde 11 a 18 semanas de edad, para el control de CRP. (*S.suis*, *A. pleuropneumoniae* y *P. multocida*).

- Cerdos de engorde y finalización, a la edad de 19 semanas a talla comercial, tratamiento selectivo en animales que persisten signos clínicos respiratorios (*Streptococcus spp*, *Pasteurella spp*, *Actinobacillus spp*, *Haemophilus spp*) y tratamiento de trastornos podales provocados por *F. necrophorum*.

- Madres y sementales, para control de enfermedades neumónicas, claudicación por trastornos podales y hembras en el tratamiento del puerperio MMA (mastitis, metritis y agalactia).

En Bovinos:

Para el tratamiento de infecciones respiratorias ocasionadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*.

¿Por qué escoger el producto?

- Biodisponibilidad inmediata del ingrediente activo (Ceftiofur) micronizado que facilita la rápida difusión del antibiótico en el organismo antes de 15 minutos.

- Alta estabilidad; garantizada de 60 días una vez abierto el frasco.

- **Citius® 5%** es una suspensión de fácil homogeneidad lista para usarse. Días de retiro en carne 48 horas. Sin días de retiro en leche.

Dosis y administración:

Vía de Administración:

Bovinos: Intramuscular o subcutánea.

Porcinos: Intramuscular.

Bovinos:

Aplicar 1 a 3 ml por cada 50 Kg de peso durante 3 a 5 días (1 - 3 mg/Kg de peso).

Porcinos:

Aplicar 1 a 3 ml por cada 50 Kg de peso durante 3 días (1 - 3 mg/Kg de peso).

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur	50 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Cortavance®

Alivio rápido de la inflamación y el prurito

Presentación: Frasco de 76 ml

Virbac

Cortavance® es un medicamento de uso veterinario, a base de aceponato de hidrocortisona como sustancia activa, que es un dermocorticoide que alivia rápidamente la inflamación y el prurito, en lesiones dérmicas que cursen con sintomatología compatible.

Características y beneficios:

- Recomendado y avalado por el Comité Internacional de Enfermedades Alérgicas de los Animales.
- Tratamiento en spray para uso tópico exclusivo. No invasivo.
- Se puede aplicar inclusive hasta en un tercio del cuerpo a la vez, diariamente según dosis recomendada.
- **Cortavance®** puede usarse a largo plazo en el tratamiento para la dermatitis atópica.
- **Cortavance®** actúa sólo a nivel de piel. No hay absorción transdérmica a nivel de dosis y efectos secundarios nulos a insignificantes.
- Contiene HCA (acepomato de hidrocortisona) que es 30 veces más potente que la hidrocortisona, es altamente lipofílico, se absorbe rápidamente en la capa dérmica, creado un efecto de depósito concentrado de ingredientes activos.
- No produce efectos secundarios asociados a la terapia sistémica.

Dosis y administración:

- Accionar 2 veces el atomizador.
- Dosis recomendada 1.52 ug de HCA/cm² de piel afectada al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Pulsar el atomizador del spray, a una distancia aproximada de 10 cm de la zona a tratar. La dosis a aplicar será bajo indicación exclusiva del Médico Veterinario tratante, según el caso durante 7 días consecutivos.

FÓRMULA

Cada 1ml contienen:

Hidrocortisona aceponato (HCA)	0,584 mg/ml
Vehículo c.b.p	1 ml

Endogard®

Endogard® con su exclusiva combinación de cuatro principios activos lo hace único como tratamiento antiparasitario interno para perros



El hueso desparasitante más completo y palatable contra:



- Gusano del corazón
- Gusanos redondos
- Gusanos planos
- Giardia



Para dirofilariosis se recomienda administrar en forma mensual. Para giardiosis se recomienda administrar cada 24 horas durante 2 o 3 días consecutivos y dependiendo de la reinfestación repetir a las 2 o 3 semanas. El Médico Veterinario decidirá la frecuencia más adecuada para cada caso.

Cada tableta de **Endogard®** está diseñada con el sistema CPR, el cual facilita dividir la tableta. Coloque la tableta en una superficie plana con la cara Virbac hacia arriba, presione con el dedo y la tableta se fraccionará en dos partes iguales.

Endogard® es un tratamiento antiparasitario interno de amplio espectro y es palatable, lo que facilita la administración al poder manejarse como un premio.

Actúa contra los siguientes parásitos:

Nematodos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *A. braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Pneumonyssus caninum*, *Capillaria spp*, *Spirocerca lupi*, *Dipetalonema reconditum*, *Dirofilaria immitis* (microfilarias), *Dirofilaria repens*, (microfilarias), *Oncicola canis*, *Physaloptera canis*.

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *E. Vogeli*, *Spirometra spp*, *Taenia pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. serialis*, *T. multiceps*, *Diphyllobothrium spp*, *Mesocestoides spp*.

Trematodos: *Scistosoma spp*.

Protozoarios: *Giardia canis*.

Fórmula:

Cada tableta contiene	Endogard® 2.5	Endogard® 10	Endogard® 30
Febantel	37.5 mg	150 mg	450 mg
Pamoato de pirantel	36 mg	144 mg	432 mg
Praziquantel	12.5 mg	50 mg	150mg
Ivermectina	0.015 mg	0.06 mg	0.18 mg
Excipiente c.b.p.	225 mg	900 mg	2700 mg

Dosis y administración:

Administrar 1 tableta según el peso de animal como dosis única. Presentaciones para **2.5, 10 y 30 kg** de peso.

Cada kg de peso tratado con **Endogard®** equivale a:

- 15 mg de febantel.
- 14.4 mg de pamoato de pirantel.
- 5 mg de praziquantel.
- 0.006 mg de ivermectina.



Epiotic®

Solución ótica para la higiene del conducto auditivo
y pre-tratamiento de la otitis externa de perros y gatos

Presentación: Frasco de 100 ml

Virbac

Epiotic® es una solución ótica (para los oídos) con un pH neutro que actúa como un antiséptico. Su formulación única incluye Dioctil Sulfosuccinato de Sodio (DSS), EDTA disódico, cloroxilenol y ácido salicílico, así como una combinación de monosacáridos y extractos de plantas.

Características y beneficios:

- Ayuda a eliminar el exceso de secreción serosa y purulenta. Esto prepara el oído para recibir otros medicamentos de manera más efectiva.
- El ácido salicílico y el cloroxilenol actúan como antisépticos, lo que ayuda a reducir la proliferación de levaduras y bacterias que comúnmente causan la otitis externa.
- Facilita la regeneración del tejido del conducto auditivo, propiciando un ambiente favorable para su recuperación.
- **Epiotic®** contiene monosacáridos (D-galactosa, L-ramnosa y D-manosa) y extractos vegetales (ulmaria y boldo) que actúan en las capas de la piel para favorecer el equilibrio de sus defensas naturales.

Dosis y administración:

DOSIS:

- Para limpieza de rutina, aplicar cantidad suficiente de producto en un algodón seco.
- Para pre-tratamiento aplicar en cantidad suficiente para llenar por completo el canal auditivo.

MODO DE USO:

Limpiar las áreas externas de la oreja una o dos veces por semana. Pre-tratamiento: Masajear desde la base de la oreja y limpiar la suciedad con un algodón seco. Se puede usar cada 12 horas, de 3 a 5 días antes de aplicar el agente terapéutico, o según lo indique el veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ácido salicílico	200 mg
Vehículo c.b.p	100 ml



Fosfosan®

Reconstituyente mineral en solución acuosa

Presentación: Frascos de 100 ml y 500 ml



Cerdos



Ganado de carne



Ganado de leche



Solución inyectable

Virbac

Fosfosan® está indicado en bovinos (doble propósito) y porcinos (carne y pie de cría) para la prevención y tratamiento de deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre, potasio y sus consecuencias tales como osteomalacia, raquitismo, síndrome de infertilidad carencial, distrofia muscular, retención placentaria, desórdenes nerviosos, tetania hipomagnésémica.

Dosis y administración:

Especies: Bovinos (doble propósito) y porcinos (carne y pie de cría).

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.

Bovinos: Administrar 10 ml a los animales adultos y 5 ml a los terneros.

Porcinos: Administrar 5 ml a cada animal. Administrar como dosis única. Puede repetirse el tratamiento a los 15 días dependiendo del estado nutricional del animal. La duración del tratamiento será a recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Glicerofosfato de sodio 5.5 H ₂ O	14 g
Fosfato monosódico 2 H ₂ O	20.10 g
Cloruro de cobre 2 H ₂ O	0.40 g
Cloruro de potasio	0.60 g
Cloruro de magnesio 6 H ₂ O	2.50 g
Selenato de sodio	0.24 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Hexadene® Spherulites

Champú antiséptico y contra levaduras de la piel en perros y gatos

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

Para su uso en perros y gatos. El amplio espectro de la clorhexidina y su baja toxicidad hacen de **Hexadene® Spherulites** un antiséptico de elección para la curación de heridas en la piel, lavado pre-quirúrgico, piodermias, como adyuvante en infecciones por *Malassezia pachydermatis* y hongos.

Dosis y modo de uso:

Se recomienda aplicar de 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la condición clínica del paciente, hasta la mejora de los signos (2-4 semanas). Posteriormente úselo una vez por semana. A recomendación del Médico Veterinario.

Para lavado de heridas o lavado pre-quirúrgico, úselo en una dilución con una parte de **Hexadene® Spherulites** por 16 partes de agua.

MODO DE USO

Agite el producto antes de usar. Aplique **Hexadene® Spherulites** sobre el pelaje previamente mojado, dando masaje vigoroso en todo el cuerpo del animal hasta formar abundante espuma. Espere de 10 a 15 minutos antes de enjuagar perfectamente. Repita todo el procedimiento.

ADVERTENCIAS

Consulte a su médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Clorhexidina (gluconato) 20%	3.0 g
Microcápsulas	2.7 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Maxflor® L.A.

**Solución antibiótica inyectable
de larga duración**

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

Maxflor® L.A. es un antibiótico de amplio espectro para uso en rumiantes y porcinos. Para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, síndrome diarreico causado por *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, pododermatitis infecciosa bovina asociada a *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Bacteroides nodosus*, así como en queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis* y otras enfermedades causadas por bacterias susceptibles al efecto del Florfenicol.

Dosis y método de aplicación:

Bovinos intramuscular: Aplicar 1 ml por cada 20 Kg de peso.

Bovinos subcutánea: Aplicar 1 ml por cada 10 Kg de peso.

Se recomienda una segunda aplicación a las 48 horas.

Porcinos intramuscular: Aplicar 1 ml por cada 25 a 30 Kg de peso.

La duración del tratamiento será a juicio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Florfenicol	400 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Nutri-plus gel®

Suplemento energético para perros y gatos

Presentación: Tubo con 120.5 g

Virbac

Nutri-plus gel® es un suplemento energético nutricional para perros y gatos que aporta vitaminas, minerales y oligoelementos a la dieta del animal.

Es un complemento nutricional de alta energía que puede ser administrado a animales en convalecencia postoperatoria o durante alguna enfermedad, para contrarrestar la pérdida de apetito, estados carenciales, desarrollo de animales jóvenes y en períodos de esfuerzos prolongados, de estrés y entrenamiento, así como para hembras gestantes o en lactación.

Recomendado para:

Perros y gatos.

Dosis y administración:

Perros y gatos:

Si **Nutri-plus gel®** es la principal fuente de alimento, administre de 2 a 4 cucharadas por 5 kg de peso al día.

Al ser usado como complemento nutricional, administre de 1 a 2 cucharadas por cada 5 kg de peso al día.

Una cucharada equivale a 5 ml.

Vía de administración:

Oral o mezclado con el alimento.

FÓRMULA

Cada 100 g contienen:

Vitamina A	17635 UI
Vitamina D3	882 UI
Vitamina E	106 UI
Tiamina (B1)	35.25 mg
Riboflavina (B2)	3.5 mg
Piridoxina HCl (B6)	17.6 mg
Cianocobalamina (B12)	35.25 mcg
Nicotinamida	35.25 mg
Pantotenato Calcio	35.25 mg
Ácido Fólico	3.5 mg
Sulfato de magnesio	70.5 mg
Sulfato de manganeso	72.0 mg
Yoduro de Potasio	50 mg
Hierro	50 mg
Excipientes c.b.p.	100 g



Rilexine® 150

Rilexine® 150 antibiótico a base de Cefalexina

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

Rilexine® 150 es un antibiótico de amplio espectro para su uso en bovinos, porcinos, ovinos, y caprinos.

Para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, gastrointestinales, de piel y tejidos blandos.

Rilexine® 150 es un antibiótico a base de Cefalexina, en suspensión oleosa, que actúa contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas, tiene efecto bactericida y actúa por inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. La cefalexina es resistente al efecto de la betalactamasa, enzima producida por algunas bacterias gram positivas, que inactivan a las Penicilinas.

Posee una excelente difusión en los tejidos, la concentración media tisular es muy superior a la concentración media plasmática. La eliminación de la Cefalexina, se efectúa en forma activa en un 85%, por vía urinaria. Su elevado índice terapéutico, hace de la Cefalexina, el antibiótico de elección, para los tratamientos de larga acción.

Rilexine® 150, es un antibiótico selectivo, dado que la Cefalexina tiene la cualidad de eliminarse por glándula mamaria, únicamente cuando está inflamada. Cuando la ubre está sana la Cefalexina no se elimina por la leche. Esto permite recomendarse como un producto con una restricción de cero días en leche, cuando se usa en problemas infecciosos que no involucren a la ubre.

Dosis y método de aplicación:

Vía de aplicación: Intramuscular.

Bovinos:

Aplicar 1 ml por cada 15 - 20 Kg de peso.

Porcinos, ovinos y caprinos:

Aplicar 1 ml por cada 15 Kg de peso.

Los tratamientos pueden repetirse cada 12 a 24 horas por 3 días consecutivos o a juicio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Cefalexina (monohidrato)	150 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Megludyne®

Anti-inflamatorio no esterooidal
en solución acuosa inyectable.

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

Megludyne® está indicado en bovinos, caprinos, ovinos, cerdos y equinos, para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas e inflamación aguda relacionada con enfermedades del tracto respiratorio y reproductivo.

En rumiantes y cerdos: Útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarrea.

En equinos: Dolores viscerales asociados a cólico e inflamación muscular.

Dosis y administración:

Bovino: Aplicación intravenosa o intramuscular, 2 ml por cada 45 Kg de peso (2.2 mg/Kg), cada 12 a 24 horas, por un período de hasta 5 días consecutivos.

Cerdos: Aplicación intramuscular profunda, 2 ml por cada 45 Kg de peso (2.2 mg/Kg), cada 24 horas.

Equinos: Aplicación intravenosa, 1 ml por cada 45 Kg de peso (1.1 mg/Kg), cada 12 a 24 horas de acuerdo a la severidad del caso. El tratamiento puede ser repetido por un período de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de Flunixin base)	83 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Rilexine® 200 NP

Antibiótico a base de Cefalexina,
Neomicina y Prednisolona

Presentación: Jeringas de 10 ml

Rilexine® 200 NP está indicado para el tratamiento de mastitis de vacas en producción láctea causadas por gérmenes sensibles a la fórmula (Neomicina + Cefalexina).

FÓRMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Cefalexina (monohidrato)	100 mg
Neomicina (sulfato)	100 mg
Prednisolona	10 mg
Excipiente c.b.p.	10 ml

Dosis y administración:

Vía de administración: Intramamaria.

- Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 horas durante 2 ó 3 días.

- Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón.

- Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



Rilexine® 500 N

Suspensión intramamaria
para vacas secas

Presentación: Jeringas de 10 ml

Rilexine® 500 N está indicado para el tratamiento de la mastitis durante el período seco en ganado lechero.

FÓRMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Cefalexina (benzatina)	250 mg
Neomicina (sulfato)	250 mg
Excipiente c.b.p.	10 ml

Dosis y administración:

Vía de administración: Intramamaria.

- Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto al final del último ordeño del período de lactación.

- Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón.

- Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



Sebolytic®

Champú dermatológico con acción antiseborreica para perros

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

SEBOLYTIC® es un shampoo terapéutico diseñado para el tratamiento y control de las dermatitis seborreicas en perros. Su fórmula avanzada ayuda a restaurar la integridad del pelaje y a mantener el equilibrio natural de la piel. Contiene ingredientes como gluconato de zinc, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y aceite de melaleuca para una mejor exfoliación y reducción de grasa, además de piroctona olamina para controlar hongos y bacterias que complican estas afecciones. Adicionalmente, incluye monosacáridos y extractos vegetales de ulmaria y boldo que favorecen el equilibrio de las defensas naturales de la piel.

Características y beneficios:

- Específicamente formulado para el control de desquematizaciones y trastornos queratoseborreicos mixtos.
- Sus propiedades antiseborreicas contribuyen a disminuir el exceso de sebo en la piel.
- Ayuda a que el pelaje recupere su integridad.
- Promueve el mantenimiento del equilibrio natural de la piel.
- Los componentes complementarios actúan en las capas de la piel para favorecer el equilibrio de sus defensas naturales.

Dosis y administración:

Después de mojar el pelo limpio del animal con agua, aplicar el shampoo dermatológico **SEBOLYTIC®** esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente hasta formar espuma, dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Repetir el procedimiento. Aplicar una o dos veces por semana, hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Piroctona olamina	500 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

ESPECIES DE DESTINO

Perros



Shotapen® L.A.

Antibiótico en suspensión inyectable

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml

Virbac

Shotapen® L.A. está indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiosis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y la estreptomicina, en bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Dosis y administración:

Especies: Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Vía de administración: Intramuscular.

Administrar 1 ml por cada 10-20 kg de peso (10,000 a 20,000 UI/kg) y repetir a las 72 hrs si es necesario, a recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 1 ml contienen:

Penicilina G procaína	100.000 UI
Penicilina G benzatina	100.000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato)	200 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Virbagest®

Solución oral a base de Altrenogest que es un análogo sintético de la progesterona que se utiliza para la sincronización del estro en cerdas cíclicas nulíparas, primíparas y múltiparas.

Presentación: Frascos de 900 ml



Cerdos

Virbac

Virbagest®. Es una solución para administrar directo en boca, indicado para la sincronización del estro en cerdas nulíparas en su integración al flujo de producción. Evita la reducción de la camada en hembras de segundo parto. Recuperación de condición corporal de hembras múltiparas que afecta el desempeño reproductivo.

Recomendado para:

- Cerdas nulíparas, sincronizar el celo (estro o calor) a las hembras de reemplazo necesarias para mantener el flujo de producción programado, con el fin de realizar los servicios de monta o inseminación en la granja.
- Cerdas primíparas, incrementa la fertilidad en las cerdas de primer parto después del destete al proveer un periodo más largo de recuperación metabólica de la lactación. Este periodo mayor de destete a celo mejora la condición corporal de la primípara y el tamaño de la segunda camada.
- Cerdas múltiparas, casos en que la hembra no consume suficiente alimento durante la lactación de su camada, son destetadas con una condición corporal baja y afecta el desempeño reproductivo: mayor periodo de días abiertos (intervalo destete a celo efectivo), menor tamaño de camada en siguiente parto, e incremento de repetición de celo.
- Sistema de explotación en bandas; sistema de reproducción en grupos o banda desde 3 a 6 semanas donde se sincroniza el celo al grupo de las hembras destetadas y se incorpora a este grupo las cerdas de reemplazo. De esta forma se completan bandas de manera constante, además de favorecer que los servicios de inseminación se lleven a cabo en 2 a 3 días. Los espacios de tiempo de banda a banda genera oportunidad de optimizar la desinfección y reacondicionamiento de la granja.

Dosis y administración:

DOSIS:

Administrar en cerdas nulíparas 5 ml de Virbagest® equivalente a 20 mg de altrenogest cada 24 horas durante 18 días.

En cerdas múltiparas iniciar el tratamiento 24 horas antes de destetar, 5 ml de Virbagest® durante 5 días o el tiempo que interese retrasar el estro.

Vía de administración:

Administrar por vía oral directamente en la boca o añadir sobre el alimento justo antes de servir a los animales. Los alimentos parcialmente consumidos deben desecharse junto con los residuos de los alimentos y no deben administrarse a otros animales.

ESPECIES:

Cerdas cíclicas nulíparas y múltiparas.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Altrenogest	400 mg
Vehículo c.b.p	100 ml



Virbamec® Platinum

Endectocida de larga acción para el tratamiento de parásitos internos y externos en el ganado bovino.

Presentación: Frasco 500 ml

Virbac

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea exclusivamente.

Bovinos: Administrar 1 ml por cada 50 Kg de peso a razón de 630 mcg de Ivermectina por Kg de peso, dosis única.

En garrapata común

Infestaciones hasta por
75 días

Contra Nuche

Infestaciones hasta por
140 días

Virbamec® Platinum está indicado para el tratamiento y control de infestaciones parasitarias causadas por:

Parásitos gastrointestinales: (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus* spp. (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Diclyocaulus viviparus*.

Moscas: Estadio larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Cochliomyia hominivorax* y moscas chupadoras.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*.

Garrapatas: *Boophilus* spp.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina	3.15 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Zeramec[®]

Anabólico no esterooidal y
desparasitante endectocida

Presentación: Frasco 250 ml

Virbac

Zeramec[®] está indicado como inductor del crecimiento por su efecto anabólico no esteroideo, además del tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) spp.*, piojos y ácaros en bovinos (carne) y ovinos.

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea exclusivamente.

Bovinos (carne): Administrar 1 ml de **Zeramec[®]** por cada 50 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Ovinos: Administrar 1 ml de **Zeramec[®]** por cada 25 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Beneficios:

1. Crecimiento más rápido de los animales jóvenes.
2. Disminuye el estrés del animal y sus consecuencias.
3. Destete más rápido en machos.
4. Destete con mayor peso.
5. Mayor aprovechamiento de los potreros, acortando el ciclo de engorde.
6. Controla y trata animales con parasitismo medio.
7. Efecto embellecedor.
8. Liberación prolongada durante 90 días.
9. Dosis exacta para el peso del animal.

FÓRMULA

Cada 1 ml contienen:

Ivermectina	10 mg
Zeranol	10 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Zoletil® 50

Anestésico para perros y gatos

Presentación: Frasco con 675 mg de liofilizado y diluyente estéril de 5 ml

Virbac

Zoletil® es una solución anestésica, compuesta por Tiletamina, que le confiere una anestesia disociativa óptima, además de una eficiente analgesia; y Zolazepam que es una benzodiazepina cuyo mecanismo de acción produce una inmejorable relajación muscular y un potente efecto anticonvulsivo. Indicado para todo tipo de cirugías mayores y menores, así como para sedación, tranquilización, toma de muestras, restricción, profilaxis, suturas, limpieza de oídos y otros procedimientos que ameriten la sedación del animal.

Dosis y administración:

Vía intramuscular

Perros	0.15 - 0.5 ml/Kg	7.5 a 25 mg/Kg
Gatos	0.2 - 0.3 ml/Kg	10 a 15 mg/Kg

Vía endovenosa

Perros	0.1 - 0.2 ml/Kg	5 a 10 mg/Kg
Gatos	0.1 - 0.15 ml/Kg	5 a 7.5 mg/Kg

FÓRMULA

Cada frasco de liofilizado contiene:

Tiletamina (como clorhidrato)	125 mg
Zolazepam (como clorhidrato)	125 mg
Excipientes c.b.p.	675 mg
Frasco de solvente contiene: Diluyente estéril c.b.p.	5 ml

Recomendaciones:

En caso de presentar salivación, puede ser controlada con la administración de **Atropina**:

Perros: 0.044 mg/Kg.

Gatos: 0.05 mg/Kg.

Usar como pre-anestésico por vía subcutánea, minutos antes de la administración de **Zoletil**.

No existe un antídoto específico. Para estimular el post-operatorio de un animal anestesiado con **Zoletil**, se recurre a los métodos clásicos:

- Lucha contra la hipotermia (manta caliente, bolsa de agua caliente, lámpara infrarroja)
- Tratamiento eliminatorio: perfusión más protección de las funciones hepáticas y renales.
- Estimulantes respiratorios para rápida recuperación: Una dosis de 5.5 mg/Kg de Doxapram (0.55 ml/Kg) que permite contrarrestar el efecto de 30 mg/Kg de **Zoletil**.
- Se recomienda no administrar alimentos como mínimo 12 horas antes de la aplicación.
- Se deben retirar los collares antiparasitarios 24 horas antes de la administración.

Conservación después de la reconstitución del **Zoletil**:

- 24 horas a temperatura ambiente.
- 8 días si es refrigerado a 4°C.